

در دنیای امروز عامل اصلی مرگ و میر در جهان پس از حوادث، بیماری های قلبی و عروقی است که پیش بینی می شود بیماری عروق کرونر قلب تا سال ۲۰۲۰ اصلی ترین علت مرگ و میر خواهد بود. این در حالیکه عوامل سنتی مانند سن بالا، ژنتیک، سیگار و چاقی، تنها نیمی از واریانس بیماری عروق کرونر قلبی را تبیین می کنند بنابراین لزوم بررسی سهم متغیرهای روانشناختی در این میان کماکان بصورت یک خلأ پژوهشی به چشم می خورد؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه مهارت های ارتباطی، عاطفه مثبت و منفی، معنای زندگی و پذیرش اجتماعی در بیماران عروق کرونر و افراد سالم انجام شد. روش پژوهش حاضر پس رویدادی (علی مقایسه ای) می باشد. جامعه آماری شامل کلیه بیماران عروق کرونر قلب و همراهان بیماران مراجعه کننده به بیمارستانها و کلینیک های تخصصی شهر رشت در سال ۱۳۹۵ می باشد. که از بین آنها تعداد ۲۰۰ نفر (۱۰۰ بیمار کرونر قلب زن و مرد و ۱۰۰ نفر افراد سالم زن و مرد) به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از مقیاس های مهارت های ارتباطی عطارها، عاطفه مثبت و منفی واتسن و همکاران، معنای زندگی استگرو پذیرش اجتماعی مارلو-کراون به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. بررسی فرضیه پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و یک راهه انجام شد. یافته ها نشان داد تفاوت مشاهده شده بین دو گروه بیمار و سالم در مدیریت هیجان، ادراک دیگران، عاطفه منفی و پذیرش اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراین با توجه به وجود تفاوت بین سازه های مورد بررسی در جمعیت بیماران و افراد سالم می توان بیان نمود که تنها ارایه خدمات پزشکی مانند دارو، جراحی و ... برای بیماران عروق کرونر قلبی کافی نیست و لزوم ورود روانشناسان سلامت در تیم درمانگر که تا کنون از سوی وزارت بهداشت مورد غفلت قرار گرفته اما ضروری بنظر می رسد.

کلید واژه ها:

بیماری عروق کرونر قلب، مهارت های ارتباطی، عاطفه مثبت و منفی، معنای زندگی، پذیرش اجتماعی، الگوی زیستی - روانی - اجتماعی سلامت