

تحلیل فضایی ناباروری طی سالهای 1390-1395 در استان گیلان

سارا صفری*، 105، 113،

1396-11-9

عوامل متعددی در جوامع امروزی باعث کاهش میزان تولد و باروری شده است که از جمله آنها می‌توان به ازدواج دیرهنگام، تمایل به فرزنددارشدن با تاخیر، افزایش سن، عوامل محیطی و ... اشاره کرد. سوءمصرف مواد مخدر، سیگار و به ویژه قلیان و الکل باعث کاهش باروری در زن و مرد می‌شود. همچنین مواجهه غیرمستقیم با دخانیات نیز موثر است. سیگار احتمالاً از طریق اختلال در تخمک‌گذاری، کاهش ذخیره تخمدان و جهش در گامت در کاهش باروری نقش دارد. از جمله عوامل محیطی می‌توان به سبک زندگی، چاقی، افزایش سقط و عوارض بارداری و نوزادی می‌شود، اشاره کرد. بنابر این ناباروری به یکی از معضلات جامعه امروز تبدیل شده است. به همین دلیل در این تحقیق هدف اصلی بررسی پراکندگی ناباروری در سطح استان گیلان می‌باشد که با توجه به هدف تحقیق داده‌ها بصورت میدانی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شد و به روش توصیفی - تحلیلی مورد بحث قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد. آمار مربوط به مراجعین به مراکز درمانی در استان گیلان نشان دهنده عدم یکنواختی در پراکندگی تعداد بیماران در سطح استان است. آمار مراجعین در شهرهای ناحیه مرکزی استان گیلان که اغلب دارای وضعیت جلگه‌ای هستند، نسبت به مناطق غرب گیلان و شرق گیلان بیشتر است. آمار تحلیل عددی نیز نشان دهنده ارتباط بین تعداد مراجعین و ناحیه و شهرستان محل زندگی است. بطوریکه مناطق روستایی تعداد ناباروری بیشتر است.

کلمات کلیدی : ناباروری، توزیع فضایی، عوامل محیطی، پهنه بندی، استان گیلان

[Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database](#)

[دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه‌ها](#)